



Ziele und Zielvorgaben	Indikatoren	1990	2000 <sup>a,b</sup>	Maßeinheit
<b>Ziel 6. Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen Krankheiten</b>				
<b>Zielvorgabe 7.</b> Bis 2015 die Ausbreitung von HIV/Aids zum Stillstand bringen und allmählich umkehren	18. HIV-Prävalenz bei schwangeren Frauen (15- bis 24-Jährige)	n.v.	n.v.	
	Geschätzte HIV-Prävalenz bei jungen Menschen (15- bis 24-Jährige)			(Erste verfügbare weltweite Zahlen: 1999, letzte verfügbare weltweite Zahlen: 2001.)
	Welt	1,2 0,7 1,0	1,4 0,8 1,1	Prozent insgesamt Prozent Mädn0, TDva001527
	Entwickelte Regionen	n.v.	0,2	
	Europa	n.v.	0,2	
	Entwicklungsregionen	n.v.	1,1	
	Afrika	n.v.	5,1	
	Nordafrika	n.v.	0,02	
	Afrika südlich der Sahara	n.v.	6,3	
	Lateinamerika und Karibik	n.v.	0,5	
	Asien	n.v.	0,2	
	Ostasien	n.v.	0,1	
	Südliches Zentralasien	n.v.	0,3	
	Südostasien	n.v.	0,4	
	Westasien	n.v.	0,01	
	Ozeanische Länder	n.v.	0,2	
	19. Anteil der Kondombenutzung innerhalb der kontrazeptiven Prävalenzrate <sup>h</sup>			
	Welt	n.v.	7	
	Kontrazeptive Prävalenzrate			
	Welt	57	67	
	20. Zahl der wegen HIV/Aids verwaisten Kinder <sup>i</sup>			
	Alle drei Regionen (88 Länder)	0,9	13,4	
	Afrika	0,8	11,0	
	Asien	0,007	1,8	
	Lateinamerika und Karibik	0,054	0,6	

<i>Ziele und Zielvorgaben</i>	<i>Indikatoren</i>	<i>1990</i>	<i>2000<sup>a,b</sup></i>	<i>Maßeinheit</i>
<b>Zielvorgabe 8.</b> Bis 2015 die Ausbreitung von Malaria und anderen schweren Krankheiten zum Stillstand bringen und allmählich umkehren	<p>21. Malariaprävalenz und Sterblichkeitsraten im Zusammenhang mit Malaria</p> <p>Weltweite Prävalenzrate Weltweite Sterblichkeitsrate</p> <p>Entwickelte Länder Entwicklungsländer</p> <p>Afrika Nordafrika Afrika südlich der Sahara</p> <p>Asien Ostasien Südliches Zentralasien Südostasien W a22.2(hh(TD8dr4 )6614ü)4.nv4üSüdostasien W a22.2(hh(TD8dr4 )6614ü)4.nv4üSüdostasien W a22.2(hh(TD8dr4 )6614ü)4(2(hara )TJ-1.006 -1.1437 TD0.0009 Tc0 Tw(Asien )Tj1.0778 -1.14</p>			

<i>Ziele und Zielvorgaben</i>	<i>Indikatoren</i>	<i>1990</i>	<i>2000<sup>a,b</sup></i>	<i>Maßeinheit</i>
	Westasien	n.v.	42	
	Lateinamerika und Karibik	n.v.	44	
	Ozeanische Länder	n.v.	217	
	Weltweite Sterblichkeitsrate	n.v.	28	Todesfälle je 100.000 Menschen
	Entwickelte Länder	n.v.	5	
	Entwicklungsländer	n.v.	33	
	Afrika			
	Nordafrika	n.v.	5	
	Afrika südlich der Sahara	n.v.	62	
	Asien			
	Ostasien	n.v.	19	
	Südliches Zentralasien	n.v.	40	
	Südostasien	n.v.	49	
	Westasien	n.v.	11	
	Lateinamerika und Karibik	n.v.	11	
	Ozeanische Länder	n.v.	44	
	24. Anteil der diagnostizierten und mit Hilfe der ambulanten Kurzzeittherapie DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) geheilten Tuberkulosefälle			
		11	27	Prozent diagnostiziert (Erste verfügbare Zahlen: 1995.)
		77	80	Prozent geheilt (Erste verfügbare Zahlen: 1995.)

**4. Anhang, Tabelle, Ziel 7**

Anmerkung k *soll lauten*: Weltweite Zahlen.